

VADEMECUM DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS



Edición 47° aniversario.
1975 - 2023



Belize



Bolivia



Costa Rica



República
Dominicana



Ecuador



El Salvador



Guatemala



Haití



Honduras



Nicaragua



Panamá



Perú



LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

INDICE

Desparasitantes.....	3
Vitaminas, Minerales y Reconstituyentes.....	7
Antibióticos y Antibacterianos.....	13
Antimastíticos.....	22
Antiinflamatorios y Antialérgicos.....	25
Cicatrizantes y Larvicidas.....	28
Rehidratantes.....	31
Antianémico.....	33
Antivirales.....	35
Antidiarreicos.....	37
Especialidades.....	39
Antiparasitarios Orales.....	43

Desparasitantes





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Labimec

IVERMECTINA 1%

Fórmula clásica con gran poder de protección.

Fórmula estable con Ivermectina de gran calidad.

Vehículo muy bien tolerado, no es irritante.

*Garantía de control de:
35 días garrapata 60 - 75
Tórsalo y Parásitos Internos.*



**Fórmula clásica con
gran poder de protección**

INDICACIONES:

Indicado como Endo y Ectoparasitida (parásitos internos y externos) en Bovinos y Porcinos. Controla adecuadamente los parásitos gastrointestinales y pulmonares, ácaros de la sarna, piojos chupadores, nuca o tórsalo, miasis.

Composición:

Ivermectina: 1 g

Excipiente C.S.P. : 100 ml

Dosis:

Bovinos:

1 ml por cada 50 kg/peso vivo

Porcinos:

1 ml por cada 33 kg/peso vivo

Presentación:



10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml



Levamisol

VITAMINADO 12%

*Contra parásitos internos,
gastrointestinales y pulmonares.*

*Única fórmula añadida con
Vitamina B12 para contrarrestar
la anemia causada por la
parasitosis.*

*Tiene una acción
inmunoestimulante (mejora
las defensas naturales) en los
animales.*

*Uso multiespecie: Bovinos,
porcinos, Ovinos, caninos y
caprinos.*



**¡El mayor control contra
los parásitos internos!**

INDICACIONES:

Indicado como endoparasitocida (parásitos internos) en todas las especies animales. Combate los parásitos gastrointestinales y pulmonares, adicionalmente, se añade a su fórmula un factor antianémico, la Cianocobalamina (vitamina B12).

Composición:

Levamisol (HCl): 12g

Vitamina B12: 10,000 µg

Excipiente c.s.p. : 100 mL

Dosis General:

1 ml por 22 kilos de peso vivo.

Presentación:



10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml



Hemolab

B12



Las garrapatas transmiten graves enfermedades que pueden matar a sus animales. Las más conocidas son Anaplasmosis y Piroplasmosis.

Síntomas:

*Decaimiento
Orina de color oscura
Fiebre
Postración
Inapetencia
La muerte*

**¡Máximo control contra
Anaplasmosis y Piroplasmosis!**

INDICACIONES:

Está indicado en el tratamiento de Anaplasmosis, Piroplasmosis, Babesiosis y Tripanomiasis. Baja la fiebre, disminuye el dolor y las molestias causadas por la enfermedad y ayuda a la recuperación de la anemia.

Composición:

Diminazene diacetato: 40mg
Oxitetraciclina (HCl): 100mg
Antipirina: 150 mg
Vitamina B12: 15µg
Excipiente c.s.p.: 1 mL

Dosis y Aplicación:

1mL de Hemolab B12 por cada 12 kg de peso vivo. Administrar cada 24 horas, hasta un máximo de 3 días.

VENTAJAS:

Combina en un solo producto, el tratamiento completo para las dos enfermedades y controla sus síntomas.

ANAPLASMOSIS.....Oxitetraciclina
PIROPLASMOSIS.... Diminazene Diacetato
FIEBRE..... Antipirina
ANEMIA..... Vitamina B12

Presentación:

30 ml
100 ml
250 ml



Vitaminas, Minerales y Reconstituyentes





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal



6Minerales

VITAMINADOS

Tiene los minerales indispensables para el desarrollo correcto de los animales.

La más balanceada concentración de Calcio, fósforo y Magnesio. Única fórmula mineral con todo el complejo B.

EVITE ESTOS PROBLEMAS:

Retención de placenta.

Prolapsos uterinos.

Vacas caídas.

Fiebre de leche.

Terneros débiles al nacimiento.

**¡Mejores partos y mayor
Producción Lechera!**

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de las deficiencias de Calcio, como Raquitismo, Osteomalacia, falta de crecimiento. Indicado para combatir la Fiebre de Leche, Síndrome de Vaca Caída, Eclampsia pre y post parto. Previene retenciones placentarias y prolapsos uterinos. Indicado también como reconstituyente y elemento antiestrés.

Composición:

Calcio Gluconato: 20 gr
Calcio Glicerofosfato: 0.67 gr
Magnesio Glicerofosfato: 1.88 gr
Sodio Glicerofosfato: 1.16 gr
Acido Bórico: 4.00 gr
Dextrosa: 16 mg
Cobalto Cloruro: 6 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 20 mg
Vitamina B2: 8mg
Vitamina B6: 8 mg
Vitamina B12: 5000µg
Vehículo c.s.p.: 100ml

Tratamiento PRE PARTO:

Aplicar 50 ml por 5 días consecutivos, durante el último trimestre de la gestación. (Por cualquier vía).

Tratamiento POST PARTO:

Aplicar 50 ml por 5 días consecutivos durante el primer trimestre de la lactancia. (Por cualquier vía).

Presentación:



100 ml
250 ml
500 ml





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Complejo B

FUERTE

La más alta concentración de vitaminas del Grupo B. Potente antianémico de acción inmediata. Reconstituyente de la normal condición animal. Estimulante del apetito. Recuperador en animales convalecientes.



**¡Llego el más fuerte!
¡En dosis única!**

INDICACIONES:

Indicado para la prevención y tratamiento de las afecciones causadas por la carencia o insuficiente cantidad de vitaminas del grupo B en el organismo animal; coadyuvante en el tratamiento y convalecencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y virales de diversa etiología; estimulante del apetito.

Composición:

*Vitamina B1: 1500 mg
Vitamina B2: 20 mg
Vitamina B6: 20 mg
Vitamina B12: 1500 µg
Nicotinamida: 1500 mg
Ácido pantoténico: 100 mg
Excipiente c.s.p.: 10 mL*

Dosis Aplicable:

Vía Intramuscular profunda.

Bovinos y equinos adultos: 10 mL
Terberos y potros: 5 mL
Cerdos y ovejas: 5 mL
Perros y gatos: 1 a 2 mL

Presentación:



10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL





Aminolab

FORTE

Reconstituyente, vitamínico y energético de primer orden (Complejo B y Dextrosa) Rehidratante de acción inmediata (Electrolitos de Sodio y Potasio), Alta Fuente de Aminoácidos (precursores de proteínas en el animal). Ganancia de peso de forma natural y sostenida.

PROPICIA LA RECUPERACION Y DESARROLLO DE:

*Animales de trabajo o deporte.
Animales débiles y convalecientes.
Animales jóvenes en crecimiento
Animales de ceba y engorde*

Evitando usar hormonas o anabólicos.

¡Reconstituyente y Promotor de Desarrollo y Peso!

INDICACIONES:

Tratamiento de deshidratación por procesos diarreicos, pérdida de sangre, quemaduras, vómitos, etc. Igualmente en los casos de desnutrición con retardo en el crecimiento y una disminución de la producción animal, animales sometidos o por someter a grandes esfuerzos físicos (deportes, trabajo, carga).

Composición:

*Dextrosa: 5.00 gr
Cloruro de Calcio: 15.00 mg
Cloruro de Potasio: 20.00 mg
Sulfato de Magnesio: 20.00 mg
Acetato de Sodio: 250.00 mg
Lysina: 209.40 mg
Histidina: 72.00 mg
Arginina: 95.70 mg
Ácido Aspártico: 200.10 mg
Threonina: 117.00 mg
Serina: 153.00 mg
Ácido Glumático: 540.00 mg
Prolina: 272.40 mg
Glicina: 54.60 mg*

*Cystina: 379.20 mg
Valina: 180.60 mg
Methionina: 73.00 mg
Isoleucina: 141.60 mg
Leucina: 231.00 mg
Tyrosina: 39.60 mg
Phenylalanina: 123.60 mg
Tryptophano: 30.90 mg
Vitamina B1: 250.00 mg
Vitamina B2: 20.00 mg
Vitamina B6: 20.00 mg
Vitamina B12: 10.00 µg
Nicotinamida: 200.00 mg
Cloruro de Sodio: 900.00 mg
Agua c.s.p: 100.00 ml*

Dosis Aplicable:

Para Rehidratación:

Vía Endovenosa, Subcutánea, Intraperitoneal u oral.

Animales Adultos:

1 mL por kilo de peso vivo.

Animales jóvenes:

2 mL por kilo de peso vivo.

Para Ceba y Engorde de Ganado:

Vía Intramuscular o Subcutánea, 10 ml por animal después del periodo de destete.

Para la terminación del novillo una dosis de 10 ml a los 90 días, 60 días y 30 días antes del sacrificio.

Presentación:



**250 ml
500 ml**



VACA CAÍDA

CALCIO GLUCONATO

Formula a base de Calcio Gluconato de rápida absorción en sangre.



Tu mejor solución en deficiencias de Calcio

INDICACIONES:

Se usa como fuente terapéutica de calcio en muchos tipos de deficiencia, como en la paresia de la vaca parturienta.

- Raquitismo
- Osteomalacia
- Síndrome de la vaca caída (Fiebre de leche)
- Falta de crecimiento en animales tiernos
- Deficiente producción de leche
- Enfermedad del parto en la oveja

Composición:

*Calcio Gluconato: 20 gr
Excipiente c.s.p. :100 mL*

Dosis Aplicable:

Producto que puede ser utilizado por cualquiera de las vías mencionadas: Endovenosa, Intramuscular, Intraperitoneal, Subcutánea.

Preventiva:

30 días antes del parto aplicar de 250 a 500 ml, vía endovenosa lenta, a goteo
12 a 24 horas antes del parto, repetir esta dosificación.

Curativa

A los primeros síntomas de Fiebre de Leche (vaca caída) aplicar de 250 a 500 ml, vía endovenosa lenta a goteo. En caso de ser necesario repetir a las 24 horas.

Presentación:



100 ml
250 ml
500 ml



FERTILAB

FOSFORO + SELENIO + VITAMINA E

Poderosa combinación para la estimulación de celos y regulador metabólico.



Más celos y terneros sanos al nacimiento

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de trastornos reproductivos relacionadas con las deficiencias de los elementos de la formula.

Coadyuvante en los tratamientos de atrofia de los ovarios y los testículos, anestro, ovarios estaticos, retención de la placenta, reabsorción fetal.

Favorece la aparición de los celos, estimula la función reproductiva y la maduración folicular, mejorando la tasa de concepción.

En los Machos, ayuda a prevenir el descenso de la libido, la baja calidad del semen y los trastornos de la espermatogénesis.

Apoyo en problemas de retardo del crecimiento, trastornos en la formación de hemoglobina, estres y baja respuesta inmunológica en los animales.

Dosis Aplicable:

Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos:

Administrar 5 ml por cada 100 kilos de peso vivo, vía intramuscular profunda.

Administrar cada 24 horas hasta 3 días consecutivos o según criterio del médico veterinario.

Composición:

Butaphosohan (fósforo): 100 mg

Selenito de sodio (selenio): 1.64 mg

Vitamina E: 50 mg

Excipiente c.s.p.: 1 mL

Presentación:



20 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml



Antibióticos y Antibacterianos



Cefalab

180

Cefalexina



Cefalosporina de primera Generación, antibiótico de elección contra Infecciones Respiratorias, Urogenitales, Podales, Cutáneas.

Efectivo contra la Mastitis, Metritis, Infecciones respiratorias e Infecciones de cascos.

Actua de inmediato, sin resistencia bacteriana y NO TIENE retiro en leche (Cero Horas).

En producción lechera CERO horas de retiro.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urogenital, en la piel e infecciones localizadas en los tejidos blandos. Indicado en infecciones de la glándula mamaria, como Mastitis clínica y subclínica. Para problemas e infecciones podales como la Pododermatitis séptica.

Composición:

Cefalexine (monohidrato): 180 mg
Excipiente C.S.P. : 1 ml

DOSIS Y APLICACION:

BOVINOS:

1 ml por cada 25 kilos de peso vivo.

PORCINOS, CANINOS Y FELINOS:

0.25 ml por cada 4,5 kilos de peso vivo. De 3 a 5 días o según indicación del Médico Veterinario.

Presentación:

50 ml
100 ml





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Enrolab

PLUS

Altamente concentrado: 10% Enrofloxacin (el doble que competencia). El único con BROHMEXINA: para facilitar la expulsión de la flema y secreciones y acelerar el control de la Infección. MINIMA RESISTENCIA BACTERIANA ¡EFICAZ 100%!



**¡Antibiótico y Mucolítico
en la misma fórmula!**

INDICACIONES:

Es una combinación de antibiótico con un mucolítico, indicado en el tratamiento de infecciones del aparato respiratorio, causadas por bacterias Gramnegativas, Grampositivas y micoplasma; igualmente indicado en casos de infecciones de aparato digestivo, como diarreas bacterianas, enteritis, etc. Uso en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Composición:

Enrofloxacin: 10 g
Bromhexina: 150 mg
Excipiente c.s.p. : 100 ml

DOSIS Y APLICACION:

1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

Presentación:

20 ml
50 ml
100 ml



Oxilabsina

200 L.A.

OXITETRACICLINA 20%



Larga acción en el animal. Permite tratamientos con una aplicación cada 72 horas.

Su formulación permite una dosis menos por animal y más animales por frasco

La fórmula de Oxilabsina 200 L.A. se ajusta a la dosis letal Universal del principio activo (5 - 10 mg/kilo de peso vivo), según Manual Merck de Veterinaria.

¡Fórmula Antibiótica más utilizada en el mercado!

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles al fármaco, por ejemplo Carunclo Sintomático, Edema Maligno, Antrax, Septicemia Hemorrágica, Anaplasmosis, Mastitis, Metritis, etc. Tiene en su formulación elementos que le confieren una condición de larga acción en el cuerpo del animal, hasta por 96 horas.

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HCl): 200 mg
Excipiente c.s.p.: 1 ml

DOSIS Y APLICACION:

Oxitetraciclinas comunes
1 mL por cada 10 kilos de peso vivo
50 mL para bovino de 500 kilos

OXILABSINA 200 L.A.
1 mL por cada 22 kilos de peso vivo.
22 mL para bovino de 500 kilos.

Nota: No usar en caballos y perros.

Presentación:

10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml




Broncomexin²⁰

Ideal para enfermedades respiratorias en aves y cerdos. Tratamiento de corta duración.

Producto más rendidor, 100 gramos/400 litros de agua de bebida (2 barriles).

Antibiótico de comprobada eficacia y en alta concentración: Enrofloxacin al 20% + Bromhexina (Mucolítico-Expectorante).



Exclusiva fórmula Antibiótico – Expectorante

INDICACIONES:

Es un producto que combina acción de un antimicrobiano sintético de amplio espectro con un mucolítico, expectorante ayudando a controlar y tratar las enfermedades respiratorias Bronquitis, Faringitis, Traqueítis y Sinusitis.

COMPOSICIÓN:

*Enrofloxacin base: 20 g
Bromhexina HCl: 1.0 g
Excipientes c.s.p. : 100 g*

DOSIS Y APLICACION:

Cerdos y Aves (Pollos, pavos, gallinas):
Administrar 100 g por cada 400 L (2 barriles) de agua de bebida. (Equivalente a 62 ppm de Enrofloxacin).

Bovinos:
Administrar 10 g por cada 200 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de Enrofloxacin/kg de p.v.).

Caninos y Felinos:
Administrar 0,5 g por cada Kg de peso vivo. (Equivalente a 10 mg de Enrofloxacin/kg de p.v.).

Presentación:

25 gramos
100 gramos



Oxilabsina

VITAMINADA



El producto más completo del mercado, con una combinación Potente y Balanceada de antibiótico, minerales y vitaminas. Mejora el crecimiento en general y la productividad del animal, por la gran carga vitamínica y mineral. Aumenta la fertilidad e incubabilidad de los huevos. Mantiene alta producción en aves de postura.

"Ideal para el recibo de Pollitos"

INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro con adición importante de vitaminas variadas como: Complejo B, A, D3, E, etc.

Indicado para el control de enfermedades respiratorias como Neumonías, Bronquitis, Catarros; enfermedades aviares como Cresta Azul, Cólera y Tifoidea Aviar, diarreas bacterianas, etc.

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HCL): 55 g
Vitamina B1: 50 mg
Vitamina B2: 2000 mg
Vitamina B6: 1650 mg
Vitamina B12: 20 mg
Calcio Pantotenato: 5000 mg
Nicotinamida: 15000 mg
Vitamina E: 2000 U.I.
Vitamina A: 5000000 U.I.
Vitamina D3: 150000 U.I.
Excipiente c.s.p.: 1000 g

DOSIS Y APLICACIÓN:

Aves:

100 gramos por 100 litros de agua de bebida.

Terneros y cerdos:

2 gramos de OXILABSINA VITAMINADA por cada 9 kg de peso vivo, disuelto en el agua de bebida.

Presentación:



10 gramos
100 gramos
1 onza
1 libra.





Oxilabsina 20

SOLUBLE

Poderoso antibiótico hidrosoluble de amplio espectro a base de Oxitetraciclina en alta concentración.

"Antibiótico cuatro veces más concentrado"

INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro indicado para el control de enfermedades respiratorias como Neumonías, Bronquitis, Catarros; enfermedades aviares como Cresta Azul, Cólera y Tifoidea Aviar, Diarreas Bacterianas, etc.

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HCl): 20 g
Excipiente c.s.p.: 100 g

DOSIS:

En el agua de bebida

Aves: Dosis terapéutica: utilizar 20 mg/kg de peso vivo. Aves: 1 kg del producto por cada 1000 kg de alimento o bien 100 gramos por cada 200 litros de agua (1 Barril).

Terneros y Cerdos: : Administrar 1g de OXILABSINA 20 SOLUBLE por cada 10 Kg de peso vivo (Equivalente a 20 mg Oxitetraciclina/Kg de peso vivo)/día, durante 3 - 5 días.
Tratamiento: De 5 a 7 días, según criterio médico.

Presentación:



10 gramos
100 gramos
1 kilogramos
5 kilogramos
25 kilogramos



Enrolab

ORAL 10%

Ideal en caso de problemas dérmicos (de piel) como Dermatitis bacteriana.

Tratamiento de elección en neumonías, bronquitis, catarros por facilidad de la administración oral.

En diarreas de tipo bacteriano, genera una excelente respuesta.

Para infecciones de tipo bacteriano, genera una excelente respuesta.



"Para la terapia antibiótica oral"

INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales; por gérmenes Gram Positivos, Gram Negativos y Micoplasma.

COMPOSICIÓN:

*Enrofloxacin: 10 g
Excipiente c.s.p. : 100 ml*

Presentación:

Gotero de:

10 ml
100 ml
1 litro



DOSIS Y APLICACIÓN:

Pollos, pavos gallinas:

1 ml (20 gotas) por cada 2 litros de agua.

Bovinos y porcinos:

2 ml por cada 20 kilos de peso vivo.

Caninos, felinos y aves canoras:

2 gotas por kilo de peso vivo.

Administrar en el agua de bebida o directamente, cada 24 horas, de 3 a 5 días.





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal



Oxilabsina Inyectable

OXITETRACICLINA 5%

INDICACIONES:

Indicado en procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a las Tetraciclinas como:

- Neumonías
- Pesteurelosis
- Podedormatitis
- Anaplasmosis
- Leptospirosis
- Carhunco Bacteriano

"El tratamiento tradicional de elección en múltiples infecciones"

COMPOSICIÓN:

*Oxitetraciclina HCL: 50 Mg
Excipiente C.S.P.: 1 ml*

DOSIS Y APLICACIÓN:

DOSIFICACION:

Bovinos: 1 ml x cada 10 kg de peso vivo.

Porcinos: 0.8 ml x cada 10 kg de peso vivo.

Caninos: 0.3 ml x cada 10 kg de peso vivo.

Repetir por al menos 5 días consecutivos.

Presentación:



**10 ml
50 ml
100 ml**



Antimastiticos



Mastilab

SECADO

*Secar la vaca ayuda a:
Evita la Mastitis después del parto, lo
que genera graves problemas en la
producción y perjuicio económico.
Descansar a la glándula mamaria,
para asegurar que la siguiente
producción sea superior.*

¿Cuándo SECAR A LA VACA?

La vaca lechera debe ser secada al cumplir los 7 meses de gestación o lo que es lo mismo 60 días antes del parto.



**¡Secar la vaca ayuda a una
producción Superior!**

INDICACIONES:

Debe ser aplicado después del último ordeño de lactación, previa desinfección y escurrimiento de los pezones. Introducir el contenido de la jeringa en el cuarto afectado. Hacer masaje sobre la ubre para una mejor difusión del medicamento.

En caso de mastitis clínica, aplicar en el cuarto afectado con la frecuencia que indique el médico veterinario. Como terapia de secado, se aconseja tratar todos los cuartos de todos los animales que inicien el periodo de secado.

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina Benzatínica: 700 mg
Ampicilina (Trihidrato): 350 mg
Excipiente c.s.p. : 10 ml

DOSIS Y APLICACION:

Bovinos:

Administrar una jeringa (350 mg de Ampicilina y 700 mg de Cloxacilina benzatínica), en el cuarto afectado. Al inicio del periodo de secado. Si es necesario, repetir el tratamiento a las 24 horas.

Presentación:

**Cubeta conteniendo 60
jeringuillas o cánulas de
10 ml.**



Mastilab

LACTANCIA



Es la mejor opción porque tiene la fórmula más completa del mercado, con 3 antibióticos y 1 antiinflamatorio, específicos para tratar el problema.

Oxitetraciclina:

Actúa como antibiótico de amplio espectro y acción prolongada en el cuarto afectado.

Neomicina:

Trabaja directamente sobre el cuarto afectado, matando los gérmenes que causan la Mastitis.

Lo mejor para el combate tópico de la Mastitis

INDICACIONES:

Es una potente suspensión antibiótica intramamaria, de amplio espectro de acción, por el sinergismo de sus componentes. Está indicada en el tratamiento de Mastitis en vacas lactantes, causada por microorganismo patógenos como *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus spp*, así como bacterias coliformes, tales como *Escherichia coli*, *Enterobacter* y *Klebsiella*.

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HC): 200 mg
Neomicina (Sulfato): 250 mg
Bacitracina: 2000 UI
Prednisolona (acetato): 10 mg
Excipiente c.s.p. : 10 ml

Bacitracina:

Excelente acción antibiótica y Regeneradora de tejidos de la glándula mamaria, logrando un restablecimiento de la producción.

Prednisolona:

Potente desinflamatorio de los cuartos afectados de la ubre y elimina el dolor.

DOSIS Y APLICACION:

Aplicar suavemente el contenido de la jeringa en el interior del pezón y luego dar un suave masaje en el pezón y la ubre.

Bovinos:

Administrar 1 jeringa por cuarto afectado. Repetir el tratamiento cada 12 horas, durante 3-5 días consecutivos.

Presentación:



Cubeta conteniendo
60 jeringuillas o cánulas de 10 ml.



Antiinflamatorio y Antialérgicos





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Dexalab Forte

VITAMINADO



Corticoesteroide de primer orden (Dexametasona 20%); Potente Antiinflamatorio y antialérgico, Única fórmula del mercado con complejo B, que potencializa el efecto en la especie de destino.

Respuesta inmediata ante golpes, inflamaciones y alergias.

Casos de Uso:

- Problemas artríticos
- Reacciones alérgicas ante picaduras de animales
- Hematomas
- Tumefacciones
- Dermatitis de tipo alérgica

INDICACIONES:

Indicado como potente antiinflamatorio, antialérgico, antirreumático; en caso de golpes, torceduras, picaduras de insectos o reacciones alérgicas, en todas las especies animales.

COMPOSICIÓN:

Dexametasona: 20 mg
Vitamina B1: 1,000mg
Vitamina B6: 300 mg
Vitamina B12: 10,000 µg
Excipiente c.s.p. : 10 ml

Dosis y Aplicación:

Animales grandes (Bovinos Caballos):

10 mL de 1 a 3 días consecutivos.

Animales medianos (terneros, cerdos y ovinos): 5 ml

Animales pequeños (Perros): 1 a 2 mL

Vía Intramuscular profunda

Presentación:

10 ml
50 ml
100 ml





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Infladyne

INYECTABLE

Versátil antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esterooidal de gran acción terapéutica en diversas afecciones.



El antiinflamatorio más versátil del mercado

INDICACIONES:

Bovinos: Tratamiento de la inflamación aguda asociada con enfermedades del tracto respiratorio, mastitis aguda, coadyuvante en el tratamiento de babesiosis y anaplasmosis.

Porcinos: Ayuda en el tratamiento del síndrome MMA (Metritis-Mastitis-Agalaxia). En todos aquellos casos en los que esté contraindicada una terapia antiinflamatoria con corticoides.

Equinos: en el tratamiento de dolores viscerales asociados al cólico. Tratamiento de inflamaciones y dolores asociados a alteraciones músculo-esqueléticas. Lesiones de carrera o como posquirúrgico.

Caninos: se utiliza en procesos de artritis y lesiones de disco medular, aunque no se recomienda más de una aplicación.

Composición:

Flunixin (meglumine): 50 mg
Excipiente c.s.p.: 1 ml



DOSIS Y APLICACION:

Bovinos: Administrar por vía intravenosa lenta o intramuscular 2 mL por cada 45 Kg de peso vivo, repetir cada 24 horas, máximo hasta 3 días consecutivos.

Porcinos: Administrar por vía intramuscular 2 mL por cada 45 Kg de peso vivo, por día, en la musculatura del cuello, con un máximo de 10 mL por sitio. Máximo hasta 3 días.

Equinos: Administrar por vía intravenosa o intramuscular 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo, repetir cada 24 horas, máximo hasta 3 días consecutivos.

Caninos: Administrar por vía intravenosa 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo, repetir cada 24 horas, máximo hasta 3 días consecutivos.

Presentación:



20 ml
50 ml
100 ml

Cicatrizantes y Larvicidas





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal



Eterolabis

USO TÓPICO

Fórmula que garantiza resultados inmediatos:

- Violeta de Genciana (Cicatrizante de primer nivel)
- Ácido Fénico (Bactericida y Secante inmediato).
- Propilenglicol (Antiséptico)

"El máximo poder cicatrizante"

PROPIEDADES TERAPEUTICAS:

Posee un altísimo poder cicatrizante y antiséptico, tolerado tópicamente por la mayoría de los animales.

En heridas infectadas, tiene la capacidad de hacer una limpieza química de los tejidos, propiciando el crecimiento del tejido cicatricial, que permite una pronta curación de la herida.

COMPOSICIÓN:

Fenol: 1 g
Violeta de Genciana: 1 g
Propilenglicol: 5 g
Excipiente c.s.p: 100 ml

INDICACIONES:

Indicado para efecto cicatrizante y antiséptico, como en las desinfecciones de ombligos, descomos, heridas, intervenciones quirúrgicas. Tiene adicionalmente, efecto bactericida y secante.

DOSIS Y APLICACIÓN:

Aplicarse rociando el aerosol sobre la herida a tratarse preferiblemente dos veces al día, hasta que la herida este totalmente cicatrizada.

Presentación:

7 onzas - 210 ml
2 onzas - 60 ml





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Mata GUSANOS

La combinación de sustancias bactericidas, cicatrizantes y larvicidas, hace de Matagusanos LABIS el producto más completo en su género.

Soluciona inmediatamente el problema de heridas a la vez previene su infestación con larvas cuando se ha presentado ya la "gusanera", la eficacia como larvicidas, cicatrizante y antiséptico, solucionan todos los aspectos de la herida contaminada.



¡El mejor Larvicida del mercado!

INDICACIONES:

Para el control y prevención de gusaneras en heridas, para la curación de heridas infectadas y contaminadas con larvas de insectos; para heridas quirúrgicas como castraciones, curaciones del ombligo, cortes de cola y oreja en perros, etc.

DOSIS GENERAL:

Aplicación tópica en la herida, por lo menos dos veces al día, hasta que la herida esté completamente cicatrizada.

COMPOSICIÓN:

Alfa Cypermetrina: 0,3%
Fenol: 1 %
Fucsina: 1 %
Excipiente c.s.p: 100 ml

Presentación:



7 onzas - 210 ml
2 onzas - 60 ml



Rehidratantes



Electrovit

PLUS

Rehidratante oral de primer orden y acción inmediata. Vitaminas y Electrolitos que aseguran la recuperación total de sus animales.

Producto de elección en casos de:

- *Diarreas*
- *Vómitos*
- *Hemorragias*
- *Sudoración excesiva*
- *Traslado de animales*

*En aves, producto esencial al recibo.
En terneros ideal para tratar diarreas intensas*



**¡Todas las vitaminas y
Electrolitos esenciales!**

INDICACIONES:

Contrarrestar el desbalance eletrolítico-vitaminico, causado por la deshidratación en los casos de ingesta insuficiente de agua y alimentos, vómitos, diarreas, hemorragias, sudoración excesiva, deficiencia hormonal suprarrenal, Nefritis y traslado de animales.

COMPOSICION:

*Vitamina C: 2.5 g
Vitamina E: 100 mg
Vitamina A: 500,000 U.I.
Vitamina D3: 100,000 U.I.
Vitamina D3: 100,000 U.I.
Vitamina B1: 120 mg
Vitamina B2: 50 mg
Vitamina B6: 100 mg
Vitamina B12: 20 mg
Calcio Pantotenato: 250 mg
Cloruro de Potasio: 1.5 g
Cloruro de Sodio: 3 g
Dextrosa: 5 g
Excipiente c.s.p. : 100 g*

Aplicación:

Aves y Cerdos:

Disolver 100 g en 200 litros de agua

Bovinos y Equinos:

Disolver 10 g en 10 L de agua.

Presentación:

100 g



Antianemico





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Hierrolab Forte

B12

Fórmula concentrada de Hierrodextrano al 10% fortalecida con Vitamina B12, que le da un factor anti anémico superior. Trabaja como un tónico reconstituyente de las funciones normales. Eficaz como coadyuvante en tratamientos contra la Piroplasmosis y la Anaplasmosis (fomenta la producción de glóbulos rojos).



¡Mayor control de la Anemia!

INDICACIONES:

Indicado especialmente en las anemias por falta de hierro, principalmente en los lechones; como un tónico reconstituyente, expansor plasmático y recomendado en procesos post quirúrgicos y como coadyuvante en el tratamiento contra la Piroplasmosis.

COMPOSICION:

Hierrodextrano: 100 mg
Vitamina B12: 30 µg
Excipiente c.s.p.: 1 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:

Vía intramuscular profunda.

Profiláctica: 1 - 2 ml, entre 2 a 4 días del nacimiento.

Curativa: 2 ml inmediatamente después que aparezca los signos de anemia.

Bovinos: 5 - 10 ml. Terneros: 3 ml
Lechones 1 - 2 mL entre 2 a 4 días del nacimiento (Profiláctica).

Presentación:



10 ml
50 ml
100 ml
250 ml



Antivirales



Verrulab

CLOROBUTANOL 25%

Certificado para el control de Papilomatosis Viral

Combinado con Complejo Yodado potencializa su efecto curativo.



**¡Único tratamiento comprobado
contra Verrugas Bovinas!**

INDICACIONES:

Indicado en el tratamiento de papilomatosis (verrugas de bovinos, equinos, ovinos, caprinos y caninos).

COMPOSICION:

Clorobutanol: 25 g
Excipientes c.s.p. : 100 ml

DOSIS GENERAL:

BOVINOS, TERNEROS Y EQUINOS:

Administrar 1 mL de VERRULAB por cada 20 kg de peso vivo (equivalente de 12.5 mg de Clorobutanol/Kg de peso vivo) vía subcutánea, en el lugar de la verruga. Repetir a los 7 días y continuar el tratamiento hasta la resolución del problema.

Ovinos, Caprinos y Caninos:

Administrar 1 mL de VERRULAB por cada 10 kg de peso vivo (Equivalente a 25 mg Clorobutanol/Kg de peso vivo) por vía subcutánea, en el lugar de la verruga.

Presentación:

20 ml



Antidiarreico





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Diarrelab

Suspensión Oral

Tratamiento completo con 3 antibióticos en su fórmula, más un protector gástrico y sales de rehidratación.

Agradable sabor para facilitar la administración al animal. Gran facilidad de manejo en dosis:

- Perros y gatos c/12 horas
- Bovinos, equinos y porcinos c/24 horas



¡Fin de la diarrea en sus animales!

INDICACIONES:

DIARRELAB está indicado para el control y tratamiento de diarrea de origen bacteriano, alimentario y parasitario causada por bacterias y protozoarios.

COMPOSICIÓN:

Neomicina Sulfato: 0.70 g
Sulfametoxazole: 5.00 g
Trimetoprim: 1.00 g
Caolin: 5.00 g
Bicarbonato de Sodio: 0.35 g
Cloruro de Potasio: 0.15 g
Pectina cítrica: 0.85 g
Excipientes c.s.p. : 100 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:

Bovinos, cerdos, Ovinos:

Administrar 1mL de DIARRELAB por cada Kg de peso vivo (Equivalente a 50 mg de Sulfametoxazol - 10 mg Trimetoprim por cada Kg de peso vivo) cada día, durante 3 – 7 días.

Equinos:

Administrar 15 mL de DIARRELAB por cada 25 kg de peso vivo (equivalente a 30 mg de Sulfametaxazol - 6 mg trimetoprim por cada kg de peso vivo) Cada día, durante 3- 7 días.

Caninos, Felinos:

Administrar 3 mL de DIARRELAB por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 15 mg de Sulfametoxazol - 3 mg trimetoprim por cada KG de peso vivo) cada 12 horas, durante 3 – 7 días.

Presentación:

100 ml
250 ml
1 L



Especialidades



Complejo Yodado

C.Y.

Indicado para problemas metabólicos y tiroideos como BOCIO en animales jóvenes; Eficaz coadyuvante en el control de la AFTOSA y ESTOMATITIS VESICULAR.

Estimulante general de las funciones orgánicas. Excelente para tratamientos en problemas PODALES (Cascos, pezuñas).

Coadyuvante para regular problemas REPRODUCTIVOS en la hembra, de manera natural sin uso hormonas. Coadyuvante a los tratamientos antibióticos.



¡El mejor aliado de los tratamientos!

INDICACIONES:

Indicado para el control de las manifestaciones causadas por la carencia de yodo, Bocio, deficiencia de trabajo de los ovarios coadyuvante en el control de la Aftosa, Estomatitis Vesicular, enfermedades del aparato respiratorio, problemas podales como Panadizos y Laminitis, estimulante general del estado animal y como desinfectante general del organismo.

COMPOSICIÓN:

Yoduro de potasio: 3.22 g
Yoduro metálico: 1.60 g
Salicilato de Sodio: 9.00 g
Alcanfor: 4.00 g
Excipiente c.s.p.: 100 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:

Vía Intramuscular profunda

Animales grandes

(bovinos y equinos) 10 ml

Animales pequeños

(terneros, cerdos y perros) 2 a 5 ml

Aplique de 3 a 5 días consecutivos.

Presentación:



20 ml
50 ml
100 ml



Pilocarpina

SOLUCIÓN INYECTABLE



La pilocarpina actúa aumentando de manera inmediata el "Peristaltismo" intestinal y provocando con eso evacuaciones inmediatas.

En caballos, es eficaz en cólicos causados por acumulo de gases. Útil cuando hay parálisis del Rumen. Facilita la labor de parto y post parto, estimula las contracciones y permite vaciar el contenido uterino.

Trabaja como purgante ¡Extra rápido!

INDICACIONES:

Acción purgante extra rápida. Se obtienen evacuaciones inmediatas, vaciamiento del contenido intestinal y rápido desplazamiento del contenido gástrico. Indicado en casos de cólicos, timpanismo e indigestión en rumiantes y equinos. Indicado también como estimulante de las contracciones uterinas, facilitando la labor de parto y post parto, permitiendo liberar el contenido uterino.

COMPOSICIÓN:

Pilocarpina: 100 mg
Excipiente c.s.p. : 5 ml

DOSIS GENERAL:

Vía subcutánea.

Animales mayores: 5 ml (caballos dividir las dosis en un intervalo de 10 minutos)

Animales menores: 0.5 - 1 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:

Equinos y Bovinos: 5 mL

Especies menores: 0.5 - 1 mL. Vía Subcutanea

Presentación:

5 ml





LABIS
LABORATORIOS
Excelencia en Salud Animal

Atropina

SULFATO 2%

LABIS

Antiespasmódico y antídoto de las intoxicaciones con productos utilizados en la agricultura y en actividades domésticas como es la utilización de insecticidas así como en los casos de intoxicación general



¡El antídoto que no puede faltar en tu botiquín!

INDICACIONES:

Es un inhibidor de la acetilcolina y un agente antimuscarínico. Por estas propiedades, su principal indicación en medicina veterinaria es como antídoto en caso de intoxicaciones, como los insecticidas agrícolas y de uso doméstico.

DOSIS Y APLICACIÓN:

En animales mayores como bovinos y equinos se recomienda una dosis de 5c.c por vía intramuscular o intravenosa lenta, si es el caso de una emergencia, pudiendo repetirse de acuerdo a la persistencia de los síntomas.

En animales pequeños la dosis será de acuerdo al peso del animal, tentativamente dosis de 0.5 a 2 c.c repetidas a discreción del profesional Veterinario.

COMPOSICIÓN:

Sulfato de Atropina: 2 g
Excipiente c.s.p.: 100 ml

Presentación:

10 ml



Antiparasitarios Orales



EQUUS DUO

Ivermectina+Praziquantel



Fórmula completa con Ivermectina y Praziquantel (Barre todos los parásitos internos adultos y larvas)

Una jeringa alcanza para 600 kilos de tratamiento.

**¡La mejor fórmula del mercado
y con buen sabor!**

INDICACIONES:

Fórmula completa con Ivermectina y Praziquantel (Barre todos los parásitos internos adultos y larvas). Una jeringa alcanza para 600 kilos de tratamiento. Agradable sabor a manzana. Facilita la aplicación oral al caballo.

COMPOSICIÓN:


Praziquantel: 15 g.
Ivermectina: 2 g.
Excipiente C.S.P.: 100 g

DOSIS Y APLICACIÓN:

200 mg de Ivermectina y 1 mg Praziquantel por kilo de peso vivo. (En la práctica 1 ml por cada 100 kg de peso).

Presentación: Jeringa Dosificadora

Jeringa dosificadora
conteniendo
6 gramos



PetCan

PLUS



Su completa Fórmula ataca todos los parásitos del perro (huevos y larvas).

Practica presentación en jeringa dosificadora. Agradable sabor

¡La mejor fórmula del mercado y con buen sabor!

INDICACIONES:

Esta indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales, Nematodos y Cestodos, en estado de huevos y larvarios.

COMPOSICIÓN:

Pamoato de Pirantel: 145 mg
Praziquantel: 80 mg
Ivermectina: 60 ug
Excipientes c.s.p. : 1 cc

DOSIS Y APLICACION:

Administrar 1 cc por cada 10 kg de peso vivo, Dosis única, Vía Oral.

PRECAUCIÓN:

No usar en cachorros menores a 1 mes.

No usar en perros Collie y Pastor Australiano

DOSIS:

1 ml por cada 10 kg peso vivo.

PRESENTACIÓN:

Jeringa Dosificadora

Conteniendo:

2 ml
5 ml
10 ml





HONDURAS

DEMA S.A. DE C.V.

Colonia Tara, bloque 15, casa #12.
San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: (504) 2510-5991
administracion@dema-sa.com

ECUADOR

Química Suiza Industrial del Ecuador

Av. Galo Plaza Lasso 10640 y calle Manuel
Zambrano Quito, Ecuador
Tel.: +593 2-396-1200
servicioalcliente@qsindustrial.biz

NICARAGUA

AGROPECUARIA Bravo, S.A. ABRASA

Km 2 1/2 frente a Talleres Noguera,
Carretera Norte Managua, Nicaragua.
Tels.: (505) 22497239
abrasa.importaciones@gmail.com
vbravo@abrasa.com.ni

REPÚBLICA DOMINICANA

VETERINARIA DEL NORTE C x A

Ave. 27 de Febrero #56 Santiago de
Los Caballeros Republica Dominicana
Tel.: (809) 5752363
Fax: (809) 5752156
jlopezt@live.com

COSTA RICA

Agro Suplidores de Costa Rica S.A.

Calle Potrerillos 300 metros este de Holcim,
Ofibodegas Flexipark Local F09. San Rafael - Alajuela.
Tel.: (507) 2239-3772
info@agrosuplidorescr.com

PANAMÁ

Mundo Veterinario, S.A.

Vía Interamericana Guadalupe, Edificio
Mundo Veterinario La Chorrera, Panamá.
Tel.: (507) 244-4602 / (507) 6670-4672
mundo_vet17@yahoo.com

PERÚ

ORVET/ EXIMVET

Av. Los Amautas Nro 435-La Victoria,
Chiclayo, Lambayeque-PERU
Tel.: (51) 979634892 - (51) 979342187
orvet.peru@gmail.com

BOLIVIA

Corvet SRL Corporacion Veterinaria

Av. Radial 27, entre Cuarto y 400,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel.: (591) 3341-1159
info@corvet.com.bo

GUATEMALA

CODISVET S.A.

4a. Ave. 0-16, zona 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel.: (502) 22458700
jsantacruz@laboratoriosvet.com

BELICE

ANIMAL FARM & DEPOT

San Antonio Road, Orange Walk Town, Belice.
Tel: (501) 6328414
L_cuellojr@yahoo.com

GUATEMALA

ESVETSA

Calle Real lote 87 A Aldea
Buena Vista San pedro Sacatepequez
Tel.: (502) 5918-8771
esvetsaguatemala@gmail.com

HAITÍ

ELE-HAITI

Centre de Recherches et de Service
Agro-veterinaires 60, Croix-des-Missions,
Route Nationale #1, Port-au-Prince, Haiti
Tels.: (509) 37610839 / 22270100 / 22270101 /
22270102
ele_haiti@yahoo.fr

VADEMECUM DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
*Dirección: 31 avenida sur 232 Colonia Cucumacayan,
San Salvador, El Salvador; PBX: (+503) 2222-7011
Correo: atencion.clientes@labis.com
<http://www.labis.com/>*